

牛の外部寄生虫駆除剤

牛の外部寄生虫 **ノシバエ** **クロイエバエ** **ノイエバエ** **マダニ** の駆除

動物用医薬品

ペルタツグ[®]

ペルメトリン15%含有 (ピレスロイド系)



今までもこれからも
ペルタツグ

**6ヶ月間の
効力持続**

**高い
安全性**

**休薬期間
なし**

規格：20枚入り（装着用ピン入り）

発売元



日本全薬工業株式会社
福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

製造販売元



住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社
大阪府大阪市中央区道修町二丁目2番8号

取扱い

牛の外部寄生虫 **ノサシバエ** **クロイエバエ** **駆除の** **新しいスタイル** **ノイエバエ** **マダニ**

これまで行われてきた放牧牛の外部寄生虫の駆除法としては殺虫剤の畜体直接散布や散粉及び薬浴などが一般的です。

しかしこれらの方法は、時間と労力、設備の必要性や作業の困難さなど数多くの問題がありました。

ペルタッグ® は、これらの諸問題を解決した、画期的な外部寄生虫駆除剤です。



ペルタッグ® 効果発現のしくみ

ペルタッグ® の表面に浸出したピレスロイド系の殺虫成分（ペルメトリン）が放牧牛どうしの接触で体表に付着・分散し、外部寄生虫を駆除します。



臨床試験結果(要約)から (一部抜粋)

報告 1

ノサシバエに対して高い効果を示し、1日当りの増体量は対照群の0.58kgに対し**ペルタッグ**® 装着群では43%増の0.83kgでした。

岩手大学農学部（岩手県）内藤・岩根ら
1986.6～10.
ホルスタイン種・日本短角種で試験

報告 2

ペルタッグ® 装着群はダニの寄生数が1/4になりました。

鹿児島大学農学部（鹿児島県）坂本ら
1984.6～9.
褐色和種・ホルスタイン種で試験

報告 3

ペルタッグ® 装着群288頭には夏期乳房炎、伝染性角結膜炎の発症はなく、無装着群には乳房炎7頭、ピンクアイ7頭の発症がありました。


道南農業共済組合北渡島支所、
長万部家畜診療所 今田ら
1986.6～10. ホルスタイン種で試験

ペルタッグ® の使用法

効能効果 牛の外部寄生虫（ノサシバエ、ノイエバエ、クロイエバエ、ウスイロイエバエ、マダニ）の駆除。

用法及び用量 本品を付属の装着用ピンと、アプリケーションナーにより、牛の片耳1枚ずつ1頭あたり2枚を装着する。

装着法



使用法

- ①両耳、耳介表面部（内側）に血管を避けて装着します。
- ②装着法はオールフレックスのタッグシステムに準拠してください。
- ③原則として放牧前に装着してください。もし放牧途中で装着する場合は殺ダニ剤等で牛体をクリーンな状態にしてから装着してください。
- ④放牧前に装着済みの牛を3～4日パドック飼いした後に放牧すると、より一層の効果が発現します。
- ⑤取りはずしは装着ピンの柄の部分を手ハサミ等で切断します。